

呼籲就內地武漢市肺炎病例群组個案提高警覺

敬啟者：

衛生署衛生防護中心正密切監察湖北省武漢市的肺炎病例群组個案，並特函通知學校需要提高警覺。目前，相關病原的檢測和感染原因工作正在進行中。衛生防護中心建議，若 貴子弟如出現發燒或呼吸道感染病徵，應佩戴口罩及立即求醫，衛生防護中心亦建議家長及學生需要採取以下措施以保持良好的個人及環境衛生：

- 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。
- 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少 20 秒，用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含 70 至 80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法。
- 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。當出現 呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上學，避免前往人多擠迫的地方，及盡早向醫生求診。
- 避免近距離接觸患者，特別是有急性呼吸道感染症狀的患者。
- 避免接觸動物、禽鳥或其糞便。
- 避免到濕貨街市、活家禽市場或農場。
- 注意食物安全和衛生，避免進食或飲用生或未熟透的動物產品，包括奶類、蛋類和肉類，或食用可能 被動物分泌物、排泄物（例如尿液）或產品污染的食物，除非已經煮熟、洗淨或妥為去皮。

現也促請 貴家長在子女每天上課前為他們量度體溫及留意學生健康情況，學生每天帶備不少於三個口罩備用。若 貴子弟出現發燒的情況或有不適，應立刻求診及避免上學，直至退燒後四十八小時。家長也需與校方保持聯絡，通報病情及康復情況。

學校已要求學童車司機，以及隨車人員，如有發熱或其他流感徵狀，切勿駕駛/登車，另作適當安排，並必須立即通知學校及家長。

我們要有效預防傳染病，必須保持警覺，加強個人衛生及環境清潔。家長的支持是重要的一環，謹此再次籲請各位家長通力合作，保持家居清潔衛生，時刻提醒 貴子弟注意個人衛生，落實做好一切預防傳染病的措施。

衛生防護中心已就事件設立專題網頁 <https://www.chp.gov.hk/tc/features/102465.html>，提供相關資訊及健康建議，並會每日在上述專題網頁公布符合加強監察的個案資料。有關【兒童染上傳染病的病假期建議】，祈請一併查閱。

校務處謹啟

7/1/2020

兒童染上傳染病的病假期建議

由於傳染病在適當治療下是可以控制的，患病學生如得到主診醫生的指示，可以返回學校上課。有關常見學童傳染病的病假建議，表列如下：

傳染病	潛伏期(天)	建議病假期#
桿菌痢疾*	1-7	直至肚瀉已經停止及最少有兩個相隔至少 24 小時的大便樣本，其化驗結果顯示沒有該病菌(第一個大便樣本須於完成抗生素治療 48 小時後開始收集)
水痘*	14-21	約一星期或直至所有水疱變乾
霍亂*	1-5	直至證實不再受感染(在完成抗生素療程 48 小時後，須取三個各相隔至少一天的大便樣本作化驗)
結膜炎(紅眼症)	1-12	直至眼睛不再有異常分泌物
白喉*	2-7	直至證實不再受感染(在完成抗生素療程至少 24 小時後，須有兩個各相隔至少 24 小時、以拭子從咽喉及鼻咽取得的樣本，而其培養物呈陰性化驗結果)
手足口病	3-7	直至所有水疱變乾或按醫生指示如致病原確定為 EV71 型腸病毒，則直至完全康復(即發燒及紅疹消退，以及所有水疱乾涸及結痂)後兩星期
麻疹*	7-18	由出疹翌日起計 4 天
流行性腮腺炎*	12-25	由呈現腮腺腫脹翌日起計 5 天
德國麻疹*	14-23	由出疹翌日起計 7 天
猩紅熱*	1-3	直至退燒及開始服用適當的抗生素 24 小時後
結核病*	不定	按醫生指示為準
傷寒*	7-21	直至至少連續有三個各相隔至少 24 小時取得的大便樣本，化驗顯示沒有該病菌(第一個大便樣本須於完成抗生素治療 48 小時後開始收集)
病毒性腸胃炎	1-10	直至最後一次肚瀉或嘔吐後起計 48 小時之後
甲型肝炎*	15-50	由首現黃疸病徵起計一星期或按醫生指示為準
百日咳*	7-10	直至已完成至少五天的抗生素療程或按醫生指示為準

以上建議只基於各種疾病的一般傳染期考慮。其他因素如病童的臨床情況亦在考慮之列，主診醫生須以其專業判斷，就病假的長短作最後決定。

* 法例規定該等傳染病個案須向衛生防護中心呈報。

上表並非鉅細無遺，如欲獲取其他傳染病資料，可向衛生署衛生防護中心的學校醫務主任查詢。此項規定見載於《教育條例》第 79 條。有關最新資料，請瀏覽衛生防護中心「感染控制須知」網頁。